V6 - 10/23 - ML/Ext. - MC2292

Actinal™ (*)

Prednisolona 20 mg

USO VETERINARIO

Prednisolona 20 mg. Antiinflamatorio Antialérgico.

Composición

Prednisolona 20 mg; Excipientes c.s.p. 500 mg.

Indicaciones

Corticoide oral / Antiflogístico / Antialérgico.
Estados alérgicos en general.
Estados inflamatorios no infecciosos e hipersensibilidad.
Inmunosupresión en procesos tumorales.
Dermopatías alérgicas / Artropatías no sépticas / Linfoma.

Los corticosteroides en general, interactúan con proteínas receptoras específicas en los tejidos blanco para regular la expresión de genes con capacidad de respuesta a corticosteroides, lo cual modifica las cifras y la disposición de las proteínas sintetizadas por los diversos tejidos blanco. Todo este proceso lleva un tiempo, de ahí que la acción de los corticoides no es inmediata, quedando de manifiesto luego de varias horas. En muy pocos casos la acción de los corticoides es inmediata, son los casos en que están mediadas por receptores unidos a membrana.

Los corticoides tienen acción sobre el número de linfocitos, alteran profundamente las reacciones inmunitarias de los linfocitos, estos efectos constituyen una faceta importante de la actividad antiinflamatoria e inmunosupresora de los glucocorticoides. Pueden evitar o suprimir la inflamación en respuesta a diversos fenómenos incitantes como estímulos radiantes, mecánicos, químicos, infecciosos e inmunitarios.

Las acciones antiinflamatoria e inmunosupresora de los glucocorticoides están enlazadas de manera intrincada, quizás porque ambas se originan en gran parte de la inhibición de funciones específicas de los leucocitos.

Respecto a la estructura química de la prednisolona referida a otros glucocorticoides, por poseer un doble enlace en la posición 1,2 del anillo A se ve incrementada la actividad glucocorticoide (cuatro veces con respecto a la hidrocortisona). Además este compuesto se metaboliza con mayor lentitud que la hidrocortisona.

Dosificación

En perros y gatos vía oral 1 - 2 mg por kilo de peso cada 12 a 24 horas durante 3 a 5 días.
En tratamientos prolongados, como mantenimiento, administrarlo cada 48 horas disminuyendo la dosis cada 7 - 10 días hasta lograr mantenimiento con el mínimo posible.

En perros es conveniente suministrarlo en las primeras horas de la mañana, para respetar el ciclo circadiano.

En gatos es preferible por la noche.

Contraindicaciones

No administrar en hembras preñadas.
Administrar con precaución en úlcera de córnea, glaucoma, diabetes mellitus, mal de Cushing, insuficiencia renal o cardíaca.
No administrar en animales con infecciones bacterianas.
Hay que tener en cuenta la debilitación muscular en animales delgados y la inhibición del crecimiento en animales jóvenes.

Pueden producir hepatopatías en el perro, que revierte al interrumpir el tratamiento.
Deben tomarse precauciones cuando se administra de manera rutinaria y cuando se usa en el caso de lesiones hepáticas inflamatorias.
El tratamiento en dosis altas durante varias semanas produce atrofia adrenal.
Debe considerarse la acción depresora que tiene cuando el animal está en proceso de vacunación.

Precauciones

Una dosis grande pero única, carece de efectos adversos, igual que un tratamiento breve.

A medida que la duración del tratamiento con glucocorticoide sea mayor a una semana hay incremento de la incidencia de efectos minusvalidantes y en potencia letales.

Salvo cuando se da el medicamento en tratamientos de reemplazo o de sustitución (los glucocorticoides no actúan como específicos ni curativos), y en su lugar proporcionan paliación en virtud de sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores.

Por último el cese repentino de los glucocorticoides después de tratamientos prolongados se relaciona con riesgo importante de insuficiencia suprarrenal, que puede resultar letal.

Por eso se recomienda ir disminuyendo paulatinamente la dosis, y no cortar el tratamiento abruptamente.

Almacenamiento

No conservar por encima de 30° C. Mantener al abrigo de la luz solar directa, en lugar seco e higiénico, manteniendo en su envase original, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentación

Estuche conteniendo 20 blisters por 10 comprimidos.

VENTA BAJO RECETA

Proteja el medio ambiente

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Centro Nacional de Intoxicaciones
0800-333-0160 (Argentina)

Industria Argentina

(*) Marca Registrada de **Richmond Vet Pharma**

GMP CERTIFICATE SENASA BPFPV Richmond Vet Pharma

senasa Cert. N° 05-151
Produce, comercializa y distribuye: **Laboratorios RICHMOND División Veterinaria S.A.**
Establecimiento N° 8589 | Fragata Heroína 4988
B1615ICH | Grand Bourg, Buenos Aires, Argentina
D.T.: Dr. Juan Onainty MV MN N° 6167