

Top Race^{TM (*)}

Solución Iónica
Balanceada
USO VETERINARIO



Solución iónica balanceada de alto valor energético indicado en la prevención y tratamiento de la disfunción neuromuscular en caballos de alta performance.

Composición

Selenito de Sodio Anhidro 0,0026 g; Magnesio, Borogluconato 28,6893 g; Calcio, Borogluconato 2,4080 g; Potasio, Cloruro 0,0700 g; EDTA Disódico 0,0500 g; Excipientes c.s.p. 100,0000 mL.

Equivalentes Iónicos

Selenio 0,0117 mg/mL; Magnesio 14,9000 mg/mL; Calcio 2,0000 mg/mL; Potasio 0,3600 mg/mL.

Indicaciones

Top Race es una solución iónica balanceada inyectable, de gran valor energético, indicada básicamente como terapéutica de apoyo en el síndrome de sobre entrenamiento y fatiga del caballo deportivo.

Top Race compensa el equilibrio iónico y el balance de Magnesio, Calcio y Potasio (elementos esenciales en el medio interno, equilibrio ácido base, función y dinámica muscular). Repositor de pérdidas por sudoración.

Top Race provee selenio, el cual mejora la performance y protege la integridad de la célula muscular.

Este complejo de nutrientes ayuda al animal a contrarrestar los efectos perjudiciales del ejercicio anaeróbico y la acidosis metabólica concomitante.

Top Race se indica en los cuadros de distrofia o disfunción muscular, post quirúrgicos, preventivo antes y después del ejercicio intenso, en síndrome de mala performance, fatiga del ejercicio, disturbios del medio interno (electrolítico y ácido base), síndrome del caballo exhausto, "flutter" o asincronismo o aleteo diafragmático, rabdomiolisis, "enfermedad de los lunes", enfermedad del músculo blanco y como energizante o complemento del balance dietético del caballo deportivo.

Dosificación Orientativa

Caballos deportivos: 50 a 100 mL. totales. Administrar por vía endovenosa lenta, antes o después del ejercicio.

Esta dosis podrá ser suministrada diariamente durante la semana previa a la competencia.

Restricciones de Uso

El producto no posee restricciones de tiempo precompetencia debido a que no contiene en su formulación compuestos derivados de drogas no autorizadas ni excipientes que enmascaren efectos o sustancias no admitidas por las reglamentaciones vigentes.

Su uso no compromete de forma alguna el equilibrio cardiovascular, ni genera efectos estimulantes del Sistema Nervioso Central los cuales puedan producir un cambio de actitud, comportamiento o pérdida de los sentidos del animal.

*Desarrollo original y propio de Laboratorios Richmond División Veterinaria S.A.

Sugerencias

Consulte siempre a su Médico Veterinario. Agitar previo a su uso. Envase reciclable. Destruir luego de usar. No contaminar el medio ambiente.

Precauciones

Controlar los parámetros vitales del animal previo y durante su administración. La misma deberá discontinuarse de notarse reacciones adversas.

Administrar las soluciones parenterales a temperatura corporal.

No aplicar en caballos con hipercalcemia, hiperglucemia y/o hiperkalemia. Antes de administrar el producto, verificar que el paciente no haya recibido Selenio de otra fuente, ya sea oral o inyectable.

En todos los casos, las dosis y frecuencias quedan a criterio del profesional actuante.

Conservar las condiciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del mismo.

No mezclar en la misma jeringa, cánula o envase, con cualquier otra sustancia ajena al producto (antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos).

Almacenamiento

No conservar por encima de 30° C. Mantener al abrigo de la luz, en lugar seco e higiénico, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentación

Vial conteniendo 100 y 530 mL. Envase multidosis.

VENTA BAJO RECETA / PRESCRIPCIÓN
DEL MÉDICO VETERINARIO

En Ecuador: VENTA BAJO RECETA MÉDICA

En Perú: VENTA LIBRE



Proteja el
medio ambiente

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente

En Uruguay: Descartar los envases vacíos en los centros de acopio más cercanos.

Centro Nacional de Intoxicaciones
0800-333-0160 (Argentina)

Industria Argentina

Top Race^(*)

Balanced ionic solution of high energetic value used for the treatment and prevention of neuromuscular malfunctions in high performance horses.

VETERINARY USE

(*) Original development of Richmond Laboratories Veterinary Division Corp.

Composition

Sodium Selenite Anhydrous 0.0026 g;
Magnesium borogluconate 28.6893 g; Calcium borogluconate 2.4080 g; Potassium Chloride 0.0700 g; EDTA Disodium 0.0500 g; Excipients q.s.f. 100.0000 mL.

Ionic Values

Se 0.0117 mg/mL; Mg 14.9000 mg/mL; Ca 2.0000 mg/mL; K 0.3600 mg/mL

Indications

Top Race is an injectable ionic solution of high energetic value, used as support treatment for over-training syndrome and sport horse fatigue. **Top Race** compensates the ionic equilibrium and the balance of magnesium, calcium and potassium (essential elements in the body fluids medium, acid-base balance, muscular function and dynamic) and it restores losses due to sweating.

Top Race provides selenium, which improves the animal's performance and protects the integrity of the cells.

This combination of nutrients helps the animal to counteract the damaging effects of anaerobic exercise and concomitant metabolic acidosis.

Top Race is indicated for:

Supramaximal – training syndrome, muscular malfunction, post-operation processes with long periods of decubitus or after a long anesthesia, prevention before and after intensive exercise, poor performance syndrome, exercise fatigue, body fluids imbalances (electrolytic and acid-base), exhaust equine syndrome, 'flutter' or asynchronism or diaphragmatic fluttering, exertional rhabdomyolysis, 'Monday disease', white muscle disease, and

as an energizing agent or complement of the nutritional balance or sport horses.

Osteoarticular problems or developmental problems in young animals and before and after parturition in mares.

In case of poisoning or over-medication with hepatic damage.

Dosage

Sport horses: 50 to 100 mL IV. Total daily dose, before or after exercising.

This dose can be administered daily during the week preceding the competition.

Precautions

Control the animal's vital parameters before and during administration. If adverse reactions are observed, discontinue its use immediately.

Administer the parenteral solution at ambient temperature.

Do not administer in horses with hypercalcemia, hyperglycemia and / or hyperkalemia. Before administering the product, verify that the patient has not received Selenium from another source, either oral or injectable.

Doses and frequency of administration are to be determined by a veterinarian.

Keep the asepsis and antisepsis conditions before and during administration.

Do not mix with any other product in the same syringe, cannula or container.

Advice

Consult your veterinarian. Shake before use. Recyclable container. Destroy after use. Do not contaminate the environment.

Withdrawal Period

None.

Storage

Do not store above 30 °C. Keep away from direct sunlight, in a dry and clean place, away from the reach of children, pets and uninformed people.

Presentation

Vial containing 100 and 530 mL. Multidose vial.

VET PRESCRIPTION ONLY



Made in Argentina



SENASA Cert. N° 99.136
Elabora, comercializa y distribuye / Manufactured by:
Laboratorios RICHMOND División Veterinaria S.A.
Establecimiento / Facility N° 8589 | Fragata Heroína
4988 | B16151CH | Grand Bourg, Buenos Aires, Argentina
D.T./ H.T.: Dr. Juan Onainty MV MN N° 6167

BOLIVIA: SENASAG Reg. PUV N°001701/2007
En Bolivia Importa y Distribuye **BOVIPLAN SRL** | Reg
SENASAG 07-7770 | Santa Cruz | Bolivia

VENEZUELA: REG.N°: INSAI2041PI33N07533
Importado y Distribuido por **LABORATORIOS
VIMOFARM, C.A.** | VENEZUELA | Asesor Técnico:
M.V. Karla Reyes CPE0613306690

URUGUAY: MGAP N° A-2814
Importa y Distribuye **DORALBEN S.A.** | Ruta 101, Km
26.900 | Canelones | Uruguay | Director Técnico: Ana
Díaz.

PARAGUAY: SENACSA N° 5814
Importa y Distribuye **Genesur S.R.L.** | Avda.
Sacramento N° 2194, e/Tte. 1° Demetrio Araujo e
Itapua | Asunción | Paraguay | Directora Técnica: Dra.
Lilian Riquelme Candia M.V. Matrícula N° 3429

ECUADOR: Reg. N° 10B-11772-AGROCALIDAD.
Importado y Distribuido por: **FARCOVET S.A.** | Km.
22 Vía Perimetral, Mz. 34 Sl. 57 | Bod. 3, 4, 5 y 6
Guayaquil | Ecuador.

PERÚ: Reg. SENASA Perú N° F.F4.01.I.0004
Importador | Distribuidor: **Andeanvet SAC** | RUC:
20510282362 | Dirección: Jr. San Agustín 568
Surquillo | Lima Perú

REP. DOMINICANA: N° 6191
NICARAGUA: N° MV-6709
PANAMÁ: MV-2651
HONDURAS: MV-1-6811